






Casos especials en els quals varia la maniobra de Heimlich

1. SI ESTÀS SOL (AUTOMANIOBRA)

Col·loca les mans de la mateixa manera (amb una mà, forma un puny amb el polze mirant cap amunt, i col·loca'l concretament damunt del melic i sota l'estèrum). A continuació, tapa el puny amb l'altra mà, inclina't sobre una superfície dura (el respall d'una cadira, taula o barana) i empeny-t'hi fort i cap amunt.



2. NADONS LACTANTS "MENORS D'1 ANY"





No es pot fer la maniobra de Heimlich perquè pot provocar lesions. En cas d'ennuegament, cal col·locar l'infant de cap per avall sobre un avantbraç i subjectar el cap amb la mà, mantenint-la més baixa que el cos. Dona 5 cops secs amb la part baixa de la mà entre les escàpules (espatlles).



Si no expulsa el cos estrany, gira l'infant i fes-li 5 compressions al centre del pit amb els dits índex i del cor junts. Alterna els dos cicles fins que es recuperi o arribin els serveis d'emergència.

3. EMBARASSADES O PERSONES AMB OBESITAT

No s'han de fer compressions abdominals. S'han de reemplaçar per compressions toràciques. Primer es fan els 5 cops entre les escàpules i posteriorment les compressions a l'altura del pit.



Davant qualsevol situació de parada cardíaca, cal trucar sempre als serveis d'emergència o al **112** i seguir les instruccions que facilitin.

Tots podem salvar una vida!

SI DESITGES AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE LA MANIOBRA DE RCP

Fes clic a l'enllaç següent



Escaneja aquest codi QR

