



PICADES I MOSSEGADES (I)

Principals mossegades i picades

MOSSEGADES	PICADES
Animals domèstics	Insectes
Gat	Abelles
Gos	Vespes
Rata	
Rèptils	Artròpodes
Colobres	Aranya
Escurçons	Aracnoides
	Escorpins
Humans	Animals marins
	Meduses

Mossegades

Són lesions provocades per la dentadura d'èssers vius.

Complicacions: Hemorràgia i risc d'infecció.

La **gravetat** depèn de la potència del verí, la quantitat, el pes, la patologia i la zona d'inoculació.

Rèptils

Què s'ha de fer?

- Valorar els signes vitals i avisar el 112 si és cal.
- Netejar i desinfectar la ferida.
- Repòs del membre afectat.

- Retirar tot el que comprimeixi.
- Fred local.
- Trasllat per administrar vacuna antitetànica i sèrum antiofídic.




Què no s'ha de fer?

- Aplicar remeis casolans no prescrits (lleixiu, fang, herbes).
- Cremar la ferida.
- **Torniquet, incisions i succió de verí.**

Animals domèstics

Què s'ha de fer?

- Netejar la ferida.
- Controlar l'hemorràgia si cal.
- Cobrir la ferida amb un apòsit.
- Traslladar per a profilaxi antitetànica.
- Indicar l'animal que ha mossegat perquè sigui valorat per veterinari.





Humanes

Són perilloses pels microorganismes inoculats (Staphylococcus i Streptococcus).

Localització: Solen donar-se en zones d'alt risc, mans, orelles i nas.

Síntomes: esquinçament, hematoma, risc de més infecció.

Què s'ha de fer?

Es tracta com una mossegada d'animal domèstic.

Què no s'ha de fer?

Infravalorar aquest tipus de mossegades