



# PRIMERS AUXILIS: AMPUTACIONS TRAUMÀTIQUES

Són la pèrdua d'algun membre, o part d'aquest, a conseqüència d'un traumatisme.

## Com actuar davant d'una amputació?


### 1. El temps és essencial

- **Tranquil·litzar la víctima** (l'amputació s'acostuma a associar a un estat de xoc) i **traslladar-la a un lloc segur**.
- **Evitar donar aliments o líquids a l'accidentat**, ja que no ha d'ingerir res que pugui dificultar una anestèsia posterior.
- **Trucar al 112 informant de les circumstàncies i l'estat de la víctima** (informant de la seva edat i sexe, el nivell i el tipus d'amputació, el mecanisme que l'ha provocat, etc.), **promovent el seu trasllat** (al costat del membre amputat) a

**l'hospital de la manera més ràpida possible.**

### 2. Tractament de la part amputada

- **Embolcar la part amputada** en gases estèrils o draps nets.
- **Introduir-la en una bossa de plàstic neta** i tancar-la el més hermèticament possible.
- **Omplir amb aigua una caixa o bossa de plàstic prou gran i afegir-hi gel** en quantitat suficient perquè duri fins que arribi a l'hospital.
- **Introduir la bossa amb la part amputada dins d'aquesta.**
- **Recorda:** No s'ha de col·locar la part amputada en cap cas directament en aigua o gel.



1



2



3



### 3. Tractament del membre amputat

- **Control de l'hemorràgia:** omplir el monyó amb gasa estèril i posteriorment embolicar la resta del membre fortament amb una bena, si és possible elàstica, amb la suficient pressió per tallar l'hemorràgia, però sense prémer en excés, ja que això impediria l'arribada de sang a la resta de l'extremitat. Si l'hemorràgia continua tot i aquesta mesura, elevar el membre durant uns minuts o col·locar un maneguet pneumàtic (per exemple, el maneguet de l'aparell de prendre la tensió arterial, si és que se'n disposa), afluixant-lo cada 10 min durant almenys 2-3 min. Si d'aquesta manera cedeix l'hemorràgia, no recol·loqueu el maneguet.

**Recorda:** El torniquet només està indicat davant d'una amputació on l'hemorràgia sigui impossible de controlar i corri perill la vida de la persona.

- Si la ferida està bruta netejar amb sèrum.
- Anotar les dades i el temps del succés.

### 4. Si no hi ha amputació completa

- **Embolicar suaument el membre afectat amb una bena elàstica** fins que cedeixi l'hemorràgia, però no tan fort que impedeixi l'arribada de sang a la resta del membre.
- **Posar una fèrula a la zona danyada** unint-la a un tros de material rígid.
- **Col·locar una bossa de gel** sobre la zona afectada.

