

COM ACTUAR DESPRÉS D'UNA INTOXICACIÓ AMB PRODUCTES DE NETEJA?



Normes generals d'actuació davant d'una intoxicació

1. **Mantenir la calma.**
2. **Recollir tota la informació possible sobre el que ha succeït:** Quin producte ha provocat la intoxicació (consultar etiqueta), quantitat, a quina hora es va produir la intoxicació, símptomes, edat, sexe i pes del pacient, al·lèrgies conegudes, etc.
3. **Trucar al SERVEI D'INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA (SIT):** Tel (24 h) 915 620 420, o al **112** i reportar tota la informació possible sobre el que ha succeït. **Seguir les seves indicacions**



Què fer si productes càustics entren en contacte amb la pell

- **Retirar roba, joies...**, que actuen com reservori del producte.
- **Eliminar les partícules sòlides.**
- **Rentar immediatament** amb aigua **durant almenys 20-30 minuts**. A vegades poden ser necessàries rentades més llargs. En el cas de contacte amb càustics especials (fluorhídric, fòsfor), d'ús professional, el maneig és més especialitzat.
- **No emprar antidòts químics**, és a dir, substàncies per a "neutralitzar" el corrosiu o càustic, com el suc de llimona, el bicarbonat, etc. perquè es produeixen reaccions exotèrmiques que agreugen la cremada.
- **Evitar l'autoexposició** en la persona que estigui realitzant la descontaminació o **rentades. Haurà de portar guants, mascaretes, ulleres, etc.** i **emprar un doll d'aigua a baixa pressió**.
- Seguir les recomanacions rebudes del SIT.




En cas d'inhalació accidental de tòxics

- **Retirar el subjecte de la zona** evitant la contaminació secundària (és a dir, l'exposició als rescatadors), assegurant-se **que no entrin altres persones a l'habitació** abans que s'hagi ventilat adequadament.
- Fer que la persona afectada **respiri aire fresc**, i seguir les recomanacions rebudes del SIT.



Si es produeix una esquitxada sobre els ulls

- Si s'utilitzen **lents de contacte**, treure-les immediatament després del contacte amb el producte. Les substàncies podrien acumular-se al líquid lacrimal darrere de les lents de contacte evitant l'esbandit de la substància.
- **Rentar amb aigua neta** (freda o tèbia), o **sèrum fisiològic**, retraient bé la parpella, **durant 10-20 minuts o fins i tot més temps** en funció del producte.
- **Cobrir els ulls amb un apòsit estèril**, seguir les recomanacions rebudes del SIT i **anar a un centre sanitari** per a rebre atenció mèdica.



Davant d'una ingestió d'una substància càustica

- **Retirar amb gasa les restes de la boca**, no empassar. No donar res per la boca.
- **No induir el vòmit. Tampoc realitzar un rentat gàstric** ni donar carbó activat.
- **No intentar neutralitzar** amb suc, bicarbonat, vinagre, etc., perquè es produeixen reaccions exotèrmiques (s'allibera calor), la qual cosa augmenta el dany.
- Podria ser beneficiós donar aigua o llet en els primers minuts sense forçar la ingestió, **atenent sempre el que indiquin des de l'àmbit sanitari**.
- Seguir les recomanacions rebudes del SIT.

Més Informació



ADVERTIMENT: La informació inclosa en aquesta fitxa no substitueix el consell donat pels professionals del SIT o personal sanitari d'emergències, el consell de les quals ha de prevaler.

Pla General d'Activitats Preventives 2022

